

貓下泌尿道症候群(FLUTD)

你~~的貓頻繁的進出貓砂盆?砂盆中尿塊變小?不停舔舐排尿部位?尿尿時尖叫?亂尿尿?有這樣的狀況極有可能發生”貓下泌尿道疾病”簡稱為FLUTD。FLUTD泛指貓的膀胱及尿道的疾病，可能因為結石、尿結晶或是尿圓柱造成尿道阻塞而引起排尿困難或是原因不明的自發性膀胱炎。患貓會出現頻尿、排尿困難或血尿的情形。若完全阻塞，則可能會引發腎衰竭，導致厭食、嘔吐、昏迷、死亡。

常見於公貓、肥胖不願意動的貓及多貓家族，其他因素包括遺傳、食物、體質、環境、飲水、疾病感染等。此疾病發生後，其復發機率高。

診斷

經由醫師觸診、血液學檢查、尿液檢查(尿分析及尿沉渣檢查)，輔以影像學檢查可確定引發FLUTD的原因。



治療方式

- 緊急 對於阻塞型的FLUTD，須盡早進行尿道疏通 (膀胱穿刺或導尿)。因為尿路受阻無法順利排尿，除了造成含氮廢物無法排除之外，此逆行的壓力也可能造成腎臟的傷害、離子不平衡，嚴重可能導致死亡。
- 之後，會因造成原因的不同而有不同的治療方式，若是自發性膀胱炎，則須降低貓咪的緊迫，另外可以給予藥物緩解症狀；若是結石則需進行手術將結石取出。
- 當尿路無法以導尿管疏通或因復發多次造成尿道損傷而狹窄時，則建議施以會尿道造口術以降低阻塞復發的機率。

預防與後續造顧

- 增加飲水量。可使用市售的流動式飲水器或自製飲水器以增加貓咪對飲水的興趣。
- 依照尿液檢查挑選適合的處方飼料，降低復發機率
- 增加與患貓之間的互動，在環境方面盡量提供玩具及安靜可休息的地方以降低緊迫。
- 增加排尿量。應經常清理及更換貓砂，且可考慮增加貓砂盤之數量。